



# 治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	アレルギー、過敏症																					
		痒みや赤み、顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																				
	食欲不振・吐き気																					
		吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。																				
	口内炎																					
		口の中が荒れて痛みが出る場合があります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																				
	味覚障害																					
		食事の味が分かりにくくなる場合があります。																				
	手足のしびれ																					
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																					
むくみ																						
	治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい																					
皮膚・爪症状																						
	皮膚に痒みや発赤、爪の変色、痛みなどの症状がありましたらお知らせ下さい。																					
筋肉痛・関節痛																						
	肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなる場合があります。																					
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	治療開始2週間後から抜け始めます。頭皮の清潔を保つようにしましょう。																					
検査値	白血球減少																					
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。																				
	赤血球減少(貧血)																					
	めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。																					
血小板減少																						
	鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる場合があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。																					

○爪の変化(爪の変色、爪の周囲が赤くなる、痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。