












# 【ERBITUX/FOLFIRI療法について】

(アービタックス+イリノテカン+5-FU+レボホリナート)

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬の名前	作用	点滴時間														
アロキシ注 デキサート注 ポララミン注	吐き気止めと アレルギー予防です	15分														
生理食塩液		30分														
<b>アービタックス注</b>	<b>抗がん剤です</b>	1時間														
生理食塩液		1時間														
<b>イリノテカン注</b>	<b>抗がん剤です</b>	イリノテカン注と レボホリナート 注同時に2時間														
レボホリナート注	5-FUの効果を高める お薬です															
<b>5-FU注</b>	<b>抗がん剤です</b>	約15分														
<b>5-FU注(持続)</b>	<b>抗がん剤です</b>	46時間														

アレルギー症状がなければ  
2回目以降は、点滴時間が1時間  
になります

# 治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
自覚症状	アレルギー様症状														
	痒みや赤み、顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。														
	食欲不振・吐き気														
	吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。														
	口内炎														
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行きましょう。														
	下痢														
便の回数が多くなったり強い腹痛をとまうことがあります。1日4回以上、水のような便が出るときは病院に連絡して下さい。															
色素沈着															
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。															
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)															
治療開始2週間後から抜け始めます。頭皮の清潔を保つようにしましょう。															
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)															
にきびのような発疹がでたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。															
検査値	白血球減少														
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。														
	赤血球減少(貧血)														
めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。															
血小板減少															
鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる場合があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。															



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。