
































【XELOX療法について】

(エルプラット+ゼローダ)

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、**次回の治療開始を延期することがあります。**)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬の名前	作用	点滴時間																					
アロキン注 デキサート注 ガスター注 ポララミン注	吐き気止めと アレルギー予防 です	15分																					
生理食塩液		30分																					
エルプラット注	抗がん剤です	同時に2時間 かけて点滴		<div data-bbox="750 770 1182 935" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> しびれが出やすいお薬です。 最低5日間は冷たい物の飲 食及び接触を避けてください。 </div>																			
生理食塩液																							
生理食塩液				<div data-bbox="784 1098 1093 1254" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 1回 錠 </div>																			
ゼローダ錠	抗がん剤です	朝食後																					
		夕食後																					

15日目の夕食後以降は、お薬が余っていても、
内服せずに保管しておき、次回の外来受診時に
持参してください。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
自覚症状	手足のしびれ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。点滴後5日間は、冷たい物の飲食及び接触を避けてください。																						
	アレルギー	■																					
	痒みや赤み、顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																						
	吐き気	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。																						
	口内炎																						
口の中が荒れて痛みが出ることがあります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																							
下痢									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、1日4回以上、水の様な便が出るときは、内服を中止して病院に連絡して下さい。																							
手足症候群									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
手足がチクチク痛い、赤く腫れる、水疱が生じることがあります。保湿剤で手足の乾燥を予防しましょう。痛みが出た場合は内服を中止して下さい。																							
色素沈着									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																							
検査値	白血球減少															■	■	■	■	■	■	■	
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)																						
めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。																							
血小板減少																							
鼻血や歯ぐきから血が出やすくなるがあります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。																							



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。