

【アリムタ+アバスチン療法】

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
薬の名前	作用	点滴時間																					
グラニセロンバッグ デキサート注	吐き気止めです	15分																					
アリムタ注	抗がん剤です	10分																					
アバスチン注	抗がん剤です	1時間30分		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> アレルギー症状がなければ 2回目は点滴時間が60分 3回目は30分になります </div>																			
生理食塩液		15分																					
パンビタン末	葉酸を含む 総合ビタミンです	1日1回 内服																					
※ アリムタ注による副作用軽減のため、パンビタン末(葉酸の粉薬)の内服(毎日)、メチコバル(ビタミンB12)の注射(3ヶ月毎)を行います。																							


治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	食欲不振・吐き気																					
	吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。																					
自覚症状	皮疹																					
	皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
検査値	白血球減少																					
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																					
		めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。																				
検査値	血小板減少																					
	鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる場合があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。																					

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。