

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状	食欲不振・吐き気																					
	吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。																					
	口内炎																					
	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行きましょう。																					
	味覚障害																					
	食事の味が分かりにくくなる場合があります。																					
	手足のしびれ																					
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																					
むくみ																						
治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい																						
皮膚・爪症状																						
皮膚に痒みや発赤、爪の変色、痛みなどの症状がありましたらお知らせ下さい。																						
筋肉痛・関節痛																						
肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなる場合があります。																						
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
治療開始2週間後から抜け始めます。頭皮の清潔を保つようにしましょう。																						
検査値	白血球減少																					
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																					
めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。																						
血小板減少																						
鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる場合があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。																						

○爪の変化(爪の変色、爪の周囲が赤くなる、痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。