

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
自覚症状	過敏症																						痒みや赤み、顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。	
	食欲不振・吐き気																						吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。	
	筋肉痛・関節痛																						肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。	
	口内炎																						口の中が荒れて痛みが出るがあります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。	
	手足のしびれ																						手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出るがあります。	
	便秘																							水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節可能ですので、ご相談ください。
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							治療開始2週間後から抜け始めます。頭皮の清潔を保つようにしましょう。
検査値	白血球減少																						感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。	
	赤血球減少(貧血)																						めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。	
	血小板減少																						鼻血や歯ぐきから血が出やすくなるがあります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。	



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。