

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
自覚症状	手足のしびれ	注意	注意	注意	注意	注意	注意								
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。点滴後5日間は、冷たい物の飲食及び接触を避けてください。														
	アレルギー様症状														
	痒みや赤み、顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。														
	吐き気														
	吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。														
	下痢														
	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまなうことがあります。1日4回以上、水のような便が出るときは病院に連絡して下さい。														
	口内炎														
口の中が荒れて痛みが出ることがあります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行きましょう。															
倦怠感															
疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。															
色素沈着															
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。															
手足症候群															
手足がチクチク痛い、赤く腫れる、ひび割れ、水疱が生じることがあります。保湿剤を使い手足の乾燥を予防しましょう。															
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)															
治療開始2週間後から抜け始めます。頭皮の清潔を保つようにしましょう。															
検査値	白血球減少														
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。														
	赤血球減少(貧血)														
めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。															
血小板減少															
鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる可能性があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。															



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。