


































# 【SOX療法について】

(S-1+エルプラット)

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、**次回の治療開始を延期することがあります。**)

|                                    |                         |                 | 1日目   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
| 薬の名前                               | 作用                      | 点滴時間            |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| アロキン注<br>デキサート注<br>ガスター注<br>ポララミン注 | 吐き気止めと<br>アレルギー予防<br>です | 15分             |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 生理食塩液                              |                         | 30分             |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>エルプラット注</b>                     | <b>抗がん剤です</b>           | 同時に2時間<br>かけて点滴 |    | しびれが出やすいお薬です。<br>最低5日間は冷たい物の飲<br>食及び接触を避けてください。                                     |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 生理食塩液                              |                         |                 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| 生理食塩液                              |                         |                 |  | 1回 錠  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>エスワンタイホウ</b>                    | <b>抗がん剤です</b>           | 朝食後             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |  |
|                                    |                         | 夕食後             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |  |

15日目の夕食後以降は、お薬が余っていても、  
内服せずに保管しておき、次回の外来受診時に  
持参してください。

# 治療による副作用

注意が必要な時期

|   |  | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |
|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 自覚症状  | 手足のしびれ   | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
|   | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。点滴後5日間は、冷たい物の飲食及び接触を避けてください。 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   | アレルギー  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
|   | 痒みや赤み、顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。           |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   | 吐き気  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■ |
|   | 吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。                      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   | 口内炎  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■ |
|   | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 下痢  | ■  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
| 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、1日4回以上、水のような便が出るときは、内服を中止して病院に連絡して下さい。        |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 手足症候群   | ■  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
| 手足がチクチク痛い、赤く腫れる、水疱が生じることがあります。保湿剤で手足の乾燥を予防しましょう。痛みが出た場合は内服を中止して下さい。 |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 色素沈着  | ■  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
| 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。                         |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 流涙(涙が出る)  | ■  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
| 涙がでたり、目の充血、目が痛い、物が見えにくい、目がかすむなどの症状が出ることがあります。                       |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 検査値   | 白血球減少  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
|   | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   | 赤血球減少(貧血)  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■ |
| めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。                                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 血小板減少   | ■  | ■   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |   |
| 鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる可能性があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。                      |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。