

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
自覚症状	食欲不振・吐き気																													
	吐き気が起こることがあります。我慢せず、吐き気止めの薬を使いましょう。																													
	筋肉痛・関節痛																													
	肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																													
	口内炎																													
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。刺激物は避けて、歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																													
手足のしびれ																														
手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																														
便秘																														
水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節可能ですので、ご相談ください。																														
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
治療開始2週間後から抜け始めます。頭皮の清潔を保つようにしましょう。																														
検査値	白血球減少																													
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。37.5度以上の発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																													
めまい・ふらつき・立ち眩みなどの症状がでたりするので注意しましょう。																														
血小板減少																														
鼻血や歯ぐきから血が出やすくなる可能性があります。普段よりも長めに止血するようにしましょう。																														

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどがありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。